

NOME SPECIE

Cavolo rapa rosso

NOME DELLA VARIETÀ

Early purple Vienna



GENERALITÀ

Pianta rustica ben adattabile, polpa bianca, raccolta 60 giorni. Varietà riproducibile!

TIPO DI TERRENO IDEALE

Predilige terreni a medio impasto, freschi profondi e ben drenati. Scegliere terreni con pH tra 6.5 e 7.5. Terreni troppo acidi possono provocare degli squilibri fisiologici

PERIODO DI TRAPIANTO

in nord italia e pieno campo

da marzo ad agosto

CONCIMAZIONI NECESSARIE

prima di trapiantare e durante la coltivazione

Concimare con letame maturo e/o compost in autunno-inverno, vangare o fresare il terreno e lasciarlo riposare fino a primavera. Prima del trapianto usare un concime con rapporto 1/1/1

DISTANZE DI TRAPIANTO

sulla fila e tra le file

Sulla fila: 35-40 cm

Tra le file: 35-40 cm

PERIODO DI RACCOLTA

da-a, oppure dopo quanti giorni/mesi dal trapianto

Si raccoglie 60 giorni dopo il trapianto

PRINCIPALI AVVERSITÀ

Peronospora: è una malattia fungina che si sviluppa sulle foglie quando ci sono condizioni di caldo umido, per esempio in giugno. Per combatterla bisogna spruzzare preventivamente le foglie con prodotti a base di rame. Cavolaia: lepidottero che gradisce particolarmente la foglia del cavolo. Spruzzare insetticidi a base di piretro
Attenzione teme i ristagni idrici!

CONSIGLI DI COLTIVAZIONE

da legare su tutore, da cimare, ecc

CARATTERISTICHE

organolettiche e proprietà nutritive

Ha un basso valore energetico ed un discreto contenuto di vitamine e sali minerali

CURIOSITÀ E/O RICETTE

campo facoltativo

La torsa può essere consumata sia cotta che cruda