

NOME SPECIE

Cavolo riccio rosso ibrido

NOME DELLA VARIETÀ

Redbor



GENERALITÀ

Steli violacei e foglie che per la forma ricordano quelle del cavolo nero.

TIPO DI TERRENO IDEALE

Predilige terreni a medio impasto, freschi, profondi e ben drenati. Scegliere terreni con pH tra 6.5 e 7.5. Terreni troppo acidi possono provocare degli squilibri fisiologici.

PERIODO DI TRAPIANTO

in nord italia e pieno campo

da maggio a settembre

CONCIMAZIONI NECESSARIE

prima di trapiantare e durante la coltivazione

Concimare con letame maturo e/o compost in autunno-inverno, vangare o fresare il terreno e lasciarlo riposare fino a primavera. Prima del trapianto usare un concime con rapporto 1/3/3.

DISTANZE DI TRAPIANTO

sulla fila e tra le file

Sulla fila: 40 cm

Tra le file: 70 cm

PERIODO DI RACCOLTA

da-a, oppure dopo quanti giorni/mesi dal trapianto

si raccoglie dopo la prima gelata.

PRINCIPALI AVVERSITÀ

Peronospora: malattia fungina che si sviluppa sulle foglie in condizioni di caldo umido. Spruzzare preventivamente le foglie con prodotti a base di rame. Cavolaia: lepidottero che gradisce particolarmente la foglia del cavolo. Usare insetticidi a base di piretro.

CONSIGLI DI COLTIVAZIONE

da legare su tutore, da cimare, ecc

Aspettare che geli prima di raccoglierlo...oppure conservarlo in freezer prima di consumarlo.

CARATTERISTICHE

organolettiche e proprietà nutritive

Ricco di vitamina A ,C, sali minerali, acido folico, contiene una serie di sostanze antiossidanti e aiuta ad alleviare tutti gli stati infiammatori dell'organismo.

CURIOSITÀ E/O RICETTE

campo facoltativo

Da consumare bollito e accompagnato da wursterl e grani d'orzo, servito con patate lessate per fare il "Grunkohl".