

NOME SPECIE

Cicoria pan di zucchero

NOME DELLA VARIETÀ

Pandea



GENERALITÀ

Varietà a ciclo precoce, molto vigorosa, tenera, detta anche cicoria Milano. Cespo di forma cilindrica con foglie carnose di colore verde brillante con evidente costa bianca.

TIPO DI TERRENO IDEALE

Si adatta a tutti i tipi di terreno, ma preferisce quelli a medio impasto, freschi e fertili con buona capacità di ritenzione idrica.

PERIODO DI TRAPIANTO

in nord italia e pieno campo

Da aprile a settembre.

CONCIMAZIONI NECESSARIE

prima di trapiantare e durante la coltivazione

La distribuzione diretta di concimi organici è sconsigliata. Si consiglia di distribuire un fertilizzante bilanciato al momento del trapianto ed intervenire con concimi nitrici in 2-3 volte al momento della sarchiatura o erpicatura.

DISTANZE DI TRAPIANTO

sulla fila e tra le file

Sulla fila: 30 cm

Tra le file: 25-35 cm

PERIODO DI RACCOLTA

da-a, oppure dopo quanti giorni/mesi dal trapianto

Si raccoglie dopo circa 70 giorni dal trapianto.

PRINCIPALI AVVERSITÀ

Il più comune è l'oidio detto "mal bianco"; tra le altre crittogame fogliari vi sono la peronospora, la ruggine e l'antracnosi; danni provengono anche dai marciumi del colletto.

CONSIGLI DI COLTIVAZIONE

da legare su tutore, da cimare, ecc

Preparare il terreno con abbondante concimazione e irrigare costantemente.

CARATTERISTICHE

organolettiche e proprietà nutritive

Indicata per gli ipertesi, cruda o cotta ha un basso tenore energetico e questo la rende indicata per regimi dietetici.

CURIOSITÀ E/O RICETTE

campo facoltativo

Consumare il cespo appena colto; si altera velocemente dopo la raccolta.