

NOME SPECIE

Cipolla borettana

NOME DELLA VARIETÀ

Bianca di Como



GENERALITÀ

Cipolla a giorno lungo a ciclo medio-precoce. Pianta poco vigorosa. Bulbo di forma molto appiattita con tuniche di colore giallo paglierino.

TIPO DI TERRENO IDEALE

Predilige terreni di medio impasto, tendenzialmente sciolti, ma si adatta anche a quelli argillosi purchè freschi, profondi e ricchi di sostanza organica.

PERIODO DI TRAPIANTO

in nord italia e pieno campo

Da marzo a giugno.

CONCIMAZIONI NECESSARIE

prima di trapiantare e durante la coltivazione

La concimazione diretta con sostanza organica è sconsigliata poiché rende i bulbi poco conservabili. Distribuire fertilizzanti a base di fosforo e potassio al momento del trapianto. Fornire nitrato di calcio in copertura senza eccedere con la quantità dato che un eccesso di azoto favorisce lo sviluppo delle foglie e ritarda la formazione del bulbo.

DISTANZE DI TRAPIANTO

sulla fila e tra le file

Sulla fila: 5-10 cm

Tra le file: 20-25 cm

PERIODO DI RACCOLTA

da-a, oppure dopo quanti giorni/mesi dal trapianto

Si raccoglie dopo 3-4 mesi dal trapianto.

PRINCIPALI AVVERSITÀ

Le crittogame principali sono il marciume dei bulbi (*Sclerotinia sclerotiorum*), peronospora, antracnosi e muffa nera; tra gli insetti teme la tignola e la mosca della cipolla.

CONSIGLI DI COLTIVAZIONE

da legare su tutore, da cimare, ecc

Si consiglia di usare terreni sabbiosi ma ricchi di sostanza organica già decomposta. Evitare ristagni idrici e scarso drenaggio

CARATTERISTICHE

organolettiche e proprietà nutritive

Abbassa la pressione arteriosa e diminuisce il glucosio nel sangue.

CURIOSITÀ E/O RICETTE

campo facoltativo

La cipolla ideale per conserve sotto aceto e in agrodolce.