


NOME SPECIE

Cipolla bianca

NOME DELLA VARIETÀ

Di Brunate



GENERALITÀ

Bulbo di pezzatura medio piccola, di forma tonda ogivale, di colore bianco, dal profumo intenso e fragrante, pronte a disfarsi alla cottura.

TIPO DI TERRENO IDEALE

Il terreno deve essere molto leggero, ricco di fosforo e potassio, previamente sottoposto ad una vangatura profonda.

PERIODO DI TRAPIANTO

in nord italia e pieno campo

Da marzo a giugno.

CONCIMAZIONI NECESSARIE

prima di trapiantare e durante la coltivazione

Distribuire fertilizzanti a base di fosforo e potassio al momento del trapianto. Fornire nitrato di calcio in copertura senza eccedere con la quantità dato che un eccesso di azoto favorisce lo sviluppo delle foglie e ritarda la formazione del bulbo.

DISTANZE DI TRAPIANTO

sulla fila e tra le file

Sulla fila: 5-10 cm

Tra le file: 20-25 cm

PERIODO DI RACCOLTA

da-a, oppure dopo quanti giorni/mesi dal trapianto

Si raccoglie dopo 3-4 mesi dal trapianto.

PRINCIPALI AVVERSITÀ

Le crittogame principali sono il marciume dei bulbi (*Sclerotinia sclerotiorum*), peronospora, antracnosi e muffa nera; tra gli insetti teme la tignola e la mosca della cipolla.

CONSIGLI DI COLTIVAZIONE

da legare su tutore, da cimare, ecc

Necessita di un clima temperato e teme temperature prossime o inferiori a 0 °C.

CARATTERISTICHE

organolettiche e proprietà nutritive

La cipolla è diuretica, depurativa, antiglicemica. È particolarmente utile nelle affezioni alla prostata. Molte delle sue proprietà benefiche si perdono con la cottura per cui, se tollerata, andrebbe consumata cruda, nelle insalate.

CURIOSITÀ E/O RICETTE

campo facoltativo

Varietà oggi quasi introvabile coltivata sul territorio di Brunate (Co). Le cipolline di Brunate erano ingrediente indispensabile per il tortino di patate, per la luganega con le cipolle e soprattutto per la zuppa di cipolle.