

## NOME SPECIE

Endivia scarola estiva

## NOME DELLA VARIETÀ

Congo



## GENERALITÀ

Ciclo medio-precoce. Varietà molto elegante a portamento eretto. Cespo ad elevato peso specifico. Cuore molto pieno di foglie arrotondate a margine intero di colore giallo intenso. Prodotto di elevato livello qualitativo!

## TIPO DI TERRENO IDEALE

Predilige terreni a medio impasto, freschi, fertili, soffici, permeabili, ben drenati ma capaci di conservare una buona percentuale di umidità anche nel periodo estivo e con un pH intorno alla neutralità.

## PERIODO DI TRAPIANTO

in nord italia e pieno campo

da marzo a settembre

## CONCIMAZIONI NECESSARIE

prima di trapiantare e durante la coltivazione

Distribuire concimi a base di azoto dopo 10/15 giorni dalla messa a dimora delle piantine, poi concimare ancora dopo circa un mese sempre con azoto

## DISTANZE DI TRAPIANTO

sulla fila e tra le file

Sulla fila: 40 cm

Tra le file: 40-60 cm

## PERIODO DI RACCOLTA

da-a, oppure dopo quanti giorni/mesi dal trapianto

Si raccoglie dopo 60-70 giorni dal trapianto

## PRINCIPALI AVVERSITÀ

Fare molta attenzione alla presenza di afidi tra le foglie, evitare i "colpi di asciutta" con irrigazioni costanti ed equilibrate

## CONSIGLI DI COLTIVAZIONE

da legare su tutore, da cimare, ecc

Imbianca facilmente da sola ma per ottenere cespi ancora più teneri e bianchi legare la chioma 20 giorni prima della raccolta

## CARATTERISTICHE

organolettiche e proprietà nutritive

Foglie carnose e coste croccanti, ideale da sola o in miscuglio con altre insalate

## CURIOSITÀ E/O RICETTE

campo facoltativo

Ha proprietà toniche, digestive, depurative, calmanti