

## NOME SPECIE

Endivia scarola

## NOME DELLA VARIETÀ

Flester



## GENERALITÀ

Volume medio, con altissimo peso specifico per la presenza di internodi molto ravvicinati. Foglie intere, senza incisioni, con la costa che mantiene una grande elasticità durante tutto il periodo di raccolta, il che porta a ridurre drasticamente le rotture del prodotto durante le lavorazioni sia per il mercato fresco che per la quarta gamma.

## TIPO DI TERRENO IDEALE

Predilige terreni a medio impasto, freschi, fertili, soffici, permeabili, ben drenati ma capaci di conservare una buona percentuale di umidità anche nel periodo estivo e con un pH intorno alla neutralità

## PERIODO DI TRAPIANTO

in nord italia e pieno campo

da marzo a settembre

## CONCIMAZIONI NECESSARIE

prima di trapiantare e durante la coltivazione

Distribuire concimi a base di azoto dopo 10/15 giorni dalla messa a dimora delle piantine, poi concimare ancora dopo circa un mese sempre con azoto

## DISTANZE DI TRAPIANTO

sulla fila e tra le file

Sulla fila: 40 cm

Tra le file: 40-60 cm

## PERIODO DI RACCOLTA

da-a, oppure dopo quanti giorni/mesi dal trapianto

Si raccoglie dopo 60-70 giorni dal trapianto

## PRINCIPALI AVVERSITÀ

Fare molta attenzione alla presenza di afidi tra le foglie, evitare i "colpi di asciutta" con irrigazioni costanti ed equilibrate

## CONSIGLI DI COLTIVAZIONE

da legare su tutore, da cimare, ecc

Legare la chioma 20 gg prima della raccolta per fare imbiancare il cespo che sarà così più tenero

## CARATTERISTICHE

organolettiche e proprietà nutritive

Ha proprietà toniche, digestive e calmanti

## CURIOSITÀ E/O RICETTE

campo facoltativo

Ideale da sola o in miscuglio con altre insalate

