

## NOME SPECIE

Fagiolo nano cannellino

## NOME DELLA VARIETÀ

Sorano



## GENERALITÀ

Varietà che allega con facilità, portando a maturazione bacelli completi e diritti contenenti 7-8 grani. Colore bacello paglierino. Buccia sottile del grano

## TIPO DI TERRENO IDEALE

Predilige terreni profondi, freschi, soffici, fertili e con pH tra il 5.5 e 7

## PERIODO DI TRAPIANTO

in nord italia e pieno campo

da aprile a giugno

## CONCIMAZIONI NECESSARIE

prima di trapiantare e durante la coltivazione

Preparare il terreno con concimazioni organiche prima del trapianto, trattandosi di una leguminosa non sono necessarie concimazioni a base di azoto, mentre è molto importante fornire fosforo

## DISTANZE DI TRAPIANTO

sulla fila e tra le file

**Sulla fila:** 15-20 cm

**Tra le file:** 50-60 cm

## PERIODO DI RACCOLTA

da-a, oppure dopo quanti giorni/mesi dal trapianto

Inizia dopo circa 2-3 mesi dal trapianto

## PRINCIPALI AVVERSITÀ

Tra le principali avversità fungine troviamo l'oidio, l'antacnosi, peronospora e ruggine. Temibili sono anche i marciumi causati da *Pythium* e *Rhizoctonia*. Afidi, nottua e insetti terricoli possono essere dannosi alla pianta

## CONSIGLI DI COLTIVAZIONE

da legare su tutore, da cimare, ecc

Rincalzare le piante dopo 10 giorni dal trapianto e mantenere il terreno pulito dalle erbe infestanti

## CARATTERISTICHE

organolettiche e proprietà nutritive

Il bacello si presenta verde e appiattito nella fase iniziale della coltura, ma con la crescita del grano si arrotonda e assume una colorazione paglierina.

## CURIOSITÀ E/O RICETTE

campo facoltativo

Il grano si consuma sia fresco che secco. La buccia sottile del grano favorisce la cottura e la digeribilità